



DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ARGHEȘ

Str. Exercițiu nr. 39 bis, Pitești
Tel.(0040)-248-22.40.15 Fax:(0040)-248-21.64.84

Nr. 1615 / 22 03 2010

COMUNICAT DE PRESA

Avand in vedere ca 24-martie este ZIUA MONDIALA DE LUPTA IMPOTRIVA TUBERCULOZEI, va rugam sa ne sprijiniti in mediatizarea informatiilor din materialul anexat acestei adrese.

Sloganul din acest an este:

“IMPOTRIVA TUBERCULOZEI- MAI MULT, MAI BINE, MAI REPEDE!”

VA MULTUMIM PENTRU COLABORARE

DIRECTOR COORDONATOR
Dr. ANCA ELENA ALEXANDRESCU



ZIUA MONDIALA DE LUPTA IMPOTRIVA TUBERCULOZEI

24- MARTIE – 2010

**“IMPOTRIVA TUBERCULOZEI – MAI MULT, MAI BINE, MAI
REPEDE!”**

Tuberculoza continua sa ramana o problema epidemiologica aproape in lumea intreaga, producand moartea mai multor milioane de oameni anual, motiv pentru care, in fiecare an, data de 24-martie este destinata a solicita atentia publica asupra acestei boli.

24-Martie, comemoreaza ziua in care doctorul Robert Koch, in 1882, a uimit comunitatea stiintifica a vremii cu descoperirea sa: bacilul care ii poarta numele si care produce tuberculoza. La vremea cand Koch anunta la Berlin descoperirea sa, tuberculoza facea ravagii in Europa si America, producand moartea unei persoane din sapte. Descoperirea lui Koch a deschis drumul catre diagnosticul si tratamentul tuberculozei.

Ce este tuberculoza?

Tuberculoza este o boala infecto-contagioasa, cu evolutie cronica, caracterizata prin prezenta de manifestari clinice si / sau radiologice, determinate de raspunsul organismului – gazda la infectia cu *Mycobacterium tuberculosis*.

Care sunt sursele de infectie?

- bolnavii de tuberculoza pulmonara activa, in special cei cu leziuni cavitare;
- bolnavii cu tuberculoze extrapulmonare active deschise su fistulizate (urogenitale, osteoarticulare, ganglionare etc.)
- animalele bolnave de tuberculoza (in special bovine) prin produse contaminate (lapte).

Factori de risc.

-slabirea sistemului imunitar datorita unei boli a acestuia, precum SIDA; unor tratamente medicale – chimioterapie sau corticoterapie;

-malnutritia;

-varsta –copiii si varstnicii prezinta un risc crescut;

-frecventarea unei comunitati in care se afla un numar mare de pacienti cu tuberculoza activa (spitale, inchisori etc.). In acest caz, este recomandata efectuarea de teste cu regularitate.

Infectia nu este egal boala. Infectia se poate transforma in boala intr-un an - doi sau niciodata, in functie de imunitatea fiecarei persoane.

Transmiterea tuberculozei.

Tuberculoza se raspandeste mai ales in mediile in care predomina malnutritia, conditiile sanitare deficitare, suprapopularea, lipsa serviciilor medicale. Calea de transmitere este aeriana prin tuse, de la bolnavii cu tuberculoza pulmonara activa.

Cum se manifesta tuberculoza?

Simptomul cel mai caracteristic este tusea, care este persistenta (peste trei saptamani) se accentueaza progresiv si se insoteste de expectoratie uneori sanguinolenta. Bolnavii mai pot acuza febra sau stare subfebrila, scaderea poftei de mancare, slabire, transpiratii nocturne, dureri in piept la respiratie sau in timpul tusei, dureri ale coloanei vertebrale sau ale principalelor articulatii.

In tara noastra tuberculoza ramane inca o problema prioritara de sanatate publica.

STRATEGIA NATIONALA DE CONTROL A TUBERCULOZEI

“ **STOP TB**” are ca baza directiile stabilite de catre **PLANUL GLOBAL al OMS de STOPARE a tuberculozei 2006 – 2015 SI PLANUL CADRU DE ACTIUNE** pentru **CONTROLUL TUBERCULOZEI in UNIUNEA EUROPEANA.**

I. CELE SASE COMPONENTE ALE STRATEGIEI STOP TB sunt =

1. Extinderea tratamentului DOTS la cele mai bune standarde de calitate.
2. Abordarea problemelor de actualitate = TB/HIV, MDR-TB, XDR –TB.
3. Inbunatatirea sistemului de sanatate.
4. Implicarea tuturor furnizorilor de servicii de sanatate.

